



สาหพรากหนั

Trichotosia velutina (Lodd. ex Lindl.) Kraenzl.

อุทยานแห่งชาติเขาค้อ จ.สระบุรี ความสูงจากระดับน้ำทะเล 200 - 1,100 เมตร

ช่วงเวลาในการออกดอก มิถุนายน - พฤศจิกายน

กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญทางช้าง รากฝอย กอเป็นกระจุก ต้นยาวได้ถึง 40 เซนติเมตร หรือมากกว่า หน่อตั้งขึ้น ต่อมาโค้งห้อยลง ต้นค่อนข้างแบน ใบ เรียงตัวสลับ รูปขอบขนาน ไม่สมมาตร แผ่นใบหนา โคนใบเป็นกาบหุ้มต้น ปลายใบสอบเรียวไม่เท่ากัน ขอบ ใบด้านหนึ่งบิดตัวได้ใบและกาบใบมีขนสีน้ำตาลแดงสั้นๆ หนาแน่นคล้ายกำมะหยี่ ลำงสุดของกาบใบขนยาวและสีสดกว่า บริเวณ ที่อยู่ถัดขึ้นมา ช่อดอก ห้อยลง ออกที่ข้อก่อนไปทางยอด ดอกในช่อดอกย่อยบานสลับทยอย ช่อหนึ่งๆ มีดอกได้ถึง 10 ดอก ใบประดับ ดอก รูปหัวใจกลับ สีเขียวสด ปกคลุมด้วยขนสีน้ำตาล ห่อตัวโอบก้านดอกย่อยไว้ ก้านดอกย่อยมีร่องตามยาว ดอก สีครีมถึงชมพูอ่อน ด้านนอกของกลีบเลี้ยงทั้งสาม ปกคลุมด้วยขนสีน้ำตาล กลีบเลี้ยงบน รูปรี กลีบเลี้ยงคู่ข้าง กางออก ไม่สมมาตร คางปลายตัด ขี้ไปด้านหลังแนบติดกับก้านดอกย่อย กลีบดอก รูปไข่กลับแกมรูปช้อน บาง กลีบปาก สีขาว รูปไข่กลับ ฐานเว้าคอด หูกกลีบปากอยู่ ใกล้ฐานปรากฏเป็นตุ่มเล็กๆ ขอบกลีบปากทั้งสองข้างสีม่วงตรงกลาง มีสันสามสัน สองสันข้างสั้นกว่าสันกลาง ระหว่างสันทั้งสาม มีขนสีครีมและชมพู อ่อนประปราย ปลายกลีบปากขอบหยักเป็นริ้ว ห่อตัวขึ้นกลางหยักเว้าเป็นรอยบาก รอยบากซี่ลง เล้าเกสรสีขาว จุ่มไปข้างหน้าเล็กน้อย อยู่ต่ำกว่ากลีบปาก ฝากรอบกลุ่มอับเรณูสีน้ำตาลเข้มเกือบดำ พบทั้งในป่าพรุ ป่าดิบชื้นและป่าดิบเขา ทั้งบนต้นไม้ และบนหิน