

สามพร้าหมก

ชื่ออื่นๆ :

Trichostia velutina (Lodd. ex Lindl.) Kraenzl.

ช่วงระยะออกดอก : มิถุนายน-พฤศจิกายน

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญทางข้าง รากฝอย กอเป็นกระจุก ต้นยาวได้ถึง 40 ซม. หรือมากกว่า หน่อตั้งขึ้น ต่อมาโค้งห้อยลง ต้นค่อนข้างแบน เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 ซม. ปล้องยาว 2.3 ซม. ใบ เรียงตัวสลับ รูปขอบขนาน ไม่สมมาตร กว้าง 2 ซม. ยาว 8.5-9 ซม. แผ่นใบหนา โคนใบเป็นกาบหุ้มต้น ปลายใบสอบเรียวไม่เท่ากัน ขอบใบด้านหนึ่งบิดตัว ใต้ใบและกาบใบมีขนสีน้ำตาลแดง สั้นๆ หนาแน่นคล้ายกำมะหยี่ ลำงสุดของกาบใบขนยาวและสีสดกว่าบริเวณที่อยู่ถัดขึ้นมา **ช่อดอก** ห้อยลง ออกที่ข้อก่อนไปทางยอด ยาว 2 ซม. ดอกในช่อทยอยบานสู่ปลายช่อ ช่อหนึ่งๆ มีดอกได้ถึง 10 ดอก ใบประดับดอก รูปหัวใจกลับ สีเขียวสด ปกคลุมด้วยขนสีน้ำตาล กว้าง 0.9 ซม. ยาว 0.8 ซม. ห่อตัวโอบก้านดอกย่อยไว้ ก้านดอกย่อยมีร่องตามยาว ยาว 0.4 ซม. **ดอก** สีครีมถึงชมพูอ่อน กว้าง 0.6 ซม. ยาว 1.5 ซม. ด้านนอกของกลีบเลี้ยงทั้งสาม ปกคลุมด้วยขนสีน้ำตาล **กลีบเลี้ยงบน** รูปรี กว้าง 0.3 ซม. ยาว 0.8 ซม. **กลีบเลี้ยงคู่ข้าง** กางออก ไม่สมมาตร คางปลายตัดขึ้นไปด้านหลังแนบติดกับก้านดอกย่อย ยาว 0.4 ซม. **กลีบดอก** รูปไข่กลับแกมรูปช้อน บาง กว้าง 0.2 ซม. ยาว 0.6 ซม. **กลีบปาก** สีขาว รูปไข่กลับ ฐานเว้าคอด กว้าง 0.5 ซม. ยาว 1.1 ซม. หูกลีบปากอยู่ใกล้ฐานปรากฏเป็นตุ่มเล็กๆ ขอบกลีบปากทั้งสองข้างสีม่วงตรงกลาง มีเส้นสามเส้น สองเส้นข้างสั้นกว่าเส้นกลาง ระหว่างเส้นทั้งสามมีขนสีครีมและชมพูอ่อนประปราย ปลายกลีบปากขอบหยักเป็นริ้ว ห่อตัวขึ้นกลางหยักเว้าเป็นรอยบาก รอยบากชี้ลง เส้าเกสรสีขาว จมูกไปข้างหน้าเล็กน้อย อยู่ต่ำกว่ากลีบปาก ฝากรอบกลุ่มอับเรณูสีน้ำตาลเข้มเกือบดำ



ถิ่นที่อยู่ : พบทั้งในป่าพรุ ป่าดิบชื้นและป่าดิบเขา ทั้งบนต้นไม้ และบนหิน