



รูดิ

ชื่ออื่นๆ :

Thecostele alata (Roxb.) C.S.P.Parish & Rchb.f.

ช่วงระยะออกดอก : เมษายน-กรกฎาคม

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : กล้ายไม้อิงอาศัย เจริญทางข้าง ลำลูกกล้วยแบน อยู่ชิดติดกัน มีสัน 2 สัน กว้าง 1.5–2.5 ซม. ยาว 2–8 ซม. ใบรูปขอบขนาน ปลายใบแหลม กว้าง 3–5 ซม. ยาว 12–23 ซม. แผ่นใบบางเรียบเป็นมัน แต่ละลำลูกกล้วยมีใบเพียง 1 ใบ พบเห็น 2 ใบได้น้อย **ช่อดอก** แบบกระจจะ ห้อยลง เกิดบริเวณโคนลำลูกกล้วย ยาว 15–50 ซม. ดอกทยอยบานหลายวัน **กลีบเลี้ยง** รูปรีปลายแหลม ลักษณะใกล้เคียงกัน กว้าง 0.4 ซม. ยาว 0.8 ซม. โคนกลีบสีเหลืองอ่อน กลางกลีบสีขาว ปลายกลีบสีม่วง มีจุดประไม่ระเบียบและขนาดแตกต่างกัน สีม่วงหรือแดงเข้มแต้มอยู่ทั่วไปทั้งกลีบ **กลีบดอก** มีสีและลักษณะเช่นเดียวกับกลีบเลี้ยง แต่ขนาดเล็กกว่า **กลีบปาก** ลักษณะเป็นหลอดยาวจากฐาน มีสัน 2 สัน อยู่ระหว่างหูกลิบบาก หูกลิบบากสีขาว โค้งไปข้างหน้า พาดด้วยแถบสีม่วง 1 แถบ ปลายกลีบปากบานออก ชีต่าลง ตรงกลางเว้าบุ๋มสีขาว มีขนสีม่วงขึ้นอยู่ทั่วเส้าเกสรสีขาว ยาว 0.5 ซม. ตรงปลายมีรยางค์คล้ายปีกนก ยาว 0.2 ซม. ฝากรอบกลุ่มอัษเรณูบางใส



ถิ่นที่อยู่ : พบทั่วไป ในป่าดิบชื้น ที่ร่มเงา หรือมีแสงแดดรำไร