

ไม้พุ่มหรือไม้ต้นเล็ก สูงได้ถึง 5 ม. เปลือก สีเขียวอมเทาถึงน้ำตาลอ่อน เรียบหรือแตกเป็นร่องตื้นๆ ไม่เป็นระเบียบ เนื้อไม้สีครีมแก่ ใน เดียว ออกสลับหรือเวียนสลับ หรือออกเป็นช่วงๆ รูปใบเข็มของขานหรือรูปใบหอกกลับ กว้าง 4-12.5 ซม. ยาว 9-30 ซม. ปลายเรียวแหลม โคนทู่หรือรูปลิ่ม ขอบเรียบ ในแก่ค่อนข้างหนาคล้ายหนัง ด้านบนสีเขียวแก่ ด้านล่าง สีอ่อนกว่า เกลี้ยงทั้งสองด้าน เส้นใบออกจากโคนใบ 1 เส้น เส้นใบข้าง มี 9-10 คู่โถงและໄปะเชื่อมกันที่ขอบใบ ก้านใบยาว 1.2-7 ซม. มีขน ด้านบนบวม เมื่อแห้งสีเข้มและเที่ยว殷ทั้งสองปลาย หูใบไม่ชัด ร่วงเร็ว ดอก สีเขียวอ่อนถึงสีขาวอมเขียว ดอกแยกเพศอยู่บนต้นเดียวกัน ออกเดียวหรือเป็นกระจุกตามซอกใบ ใบประดับเรียง 4 แฉว ดอกเพศผู้เล็กมาก มีก้านสั้น ยาวได้ถึง 2 มม. กลีบเลี้ยง 5 กลีบ กว้างประมาณ 1 มม. ยาวประมาณ 2.5 มม. รูปขอบขานโคนซ้อนกัน กว้างประมาณ 1.3 มม. ยาวประมาณ 2 มม. รูปซ้อน เกสรเพศผู้มี 3-6 อัน ยาวประมาณ 2 มม. แยกหรือเชื่อมกันที่โคน ติดกับฐานดอก ใหญ่จักเป็นพุ 5 พุ รังเข้าเป็นหมัน 3 พุ ดอกเพศเมียใหญ่กว่าดอกเพศผู้ มีก้านดอกยาวได้ถึง 2 ซม. ก้านหนาตอนปลาย กลีบเลี้ยง 5 กลีบ แยกกัน กว้างประมาณ 2.5 ยาวประมาณ 7 มม. รูปขอบขานหรือรูปสามเหลี่ยม โคนซ้อนกัน กลีบดอกแยก 5 กลีบ กว้างประมาณ 1 มม. ยาวประมาณ 1.5 ซม. เล็กกว่ากลีบเลี้ยงมาก คล้ายเกล็ด ฐานฐานดอกคล้ายในดอกเพสผู้ รังไข่เป็น 3 มุม ก้านเกสรเพศเมียสั้น ยอดเกสรเพศเมียเพศเมียเป็น 3 จ่าม ผล กว้างประมาณ 2 ซม. ยาวประมาณ 1.5 ซม. ก้านผลเรียง ยาวได้ถึง 3.5 ซม. สีเขียวอมเทา ทรงกลม กึ่งเป็น 3 พุ มีกลีบเลี้ยงติดทนแต่ไม่ขยายใหญ่ที่โคน แก่แห้ง แตกออกเป็น 3 ส่วน มีแกนกลาง เมล็ดยาวประมาณ 12 มม. มี 3 มุม ไม่มีขั้นล่างของปั๊ดบีชีน สูงได้ถึง 200 ม. ใกล้น้ำ บนพื้นปูน จังหวัด ระนอง สงขลา



ข้อมูลข้ออ้าง : ไก่ตีหน่อ, ไบอน ไบโอภาคใต้ เล่ม 3 (Mo-Z)-กรุงเทพฯ : อุณหothพรินซ์แอนด์พับลิชิชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2561. 880 หน้า
ภาษาไทยก่อน : ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุธรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดอุรา圭ร์รานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

