

ไม้ต้น ขนาดเล็กถึงกลาง สูงได้ถึง 28 เมตร เรือนยอด เป็นพุ่มแน่นสีทองแดง โคนลำต้นมักเป็นร่องและบิด ต้นไม่ค่อยสมบูรณ์ มีรากโผล่ขึ้นจากดิน ต้นแก่มีพุ่มเป็นแผ่นเปลือก สีน้ำตาลอมครีมอ่อนถึงน้ำตาลเข้ม เรียบถึงเป็นเกล็ด หรือแตกเป็นร่อง เปลือกในสีครีมอมชมพูถึงสีส้มหรือน้ำตาลแดง ใบ กว้าง 2.5-8 เซนติเมตร ยาว 7-18(24) เซนติเมตร ออกห่างๆ ส่วนมากรูปรีถึงไข่กลับ ปลายแหลมถึงทู่หรือกลม โคนแคบ ยอดอ่อนมีขนกำมะหยี่สีทองแดง แน่น ใบแก่เป็นมันด้านบน ด้านล่างมีขนละเอียดสีทองแดง หรือสีออกเทาแน่น แล้วค่อนข้างเกลี้ยง ยกเว้นบนเส้นใบ เส้นกลางใบด้านบนแบนและมีสันตรงกลาง เส้นใบ 6-13 คู่ เป็นวงและเชื่อมกันด้านบน เส้นใบย่อยเป็นร่างแหละเอียด หรือบางส่วนขนานกับเส้นใบ ก้านใบ ยาว 1-2.5 เซนติเมตร ด้านบนค่อนข้างแบน มีขนหยาบละเอียด สีน้ำตาลแดงถึงค่อนข้างเกลี้ยง กิ่งอ่อน มีขนหยาบละเอียดสีน้ำตาลแดง แน่น ดอก สีเขียวอ่อน โปรงแสงถึงสีขาวครีม ดอก สมบูรณ์เพศ ดอกเพศเมียออกเป็นกลุ่มมี 3-12 ดอก ตามง่ามใบหรือใต้แผลใบ ก้านดอกยาว 2-6 มิลลิเมตร มีขนละเอียดสีน้ำตาลแดง กลีบเลี้ยงยาวประมาณ 2.5 มิลลิเมตร ค่อนข้างกลม มีขนสีทองแดงกระจายด้านนอก ด้านในเกลี้ยง กลีบดอกยาวประมาณ 3 มิลลิเมตร (สั้นกว่ากลีบเลี้ยงในดอกเพศเมีย) แฉก กลีบรูปไข่กว้าง ยาว 1.5-2 เท่าของหลอดดอก เกสรเพศผู้ยาวประมาณ 2.5 มิลลิเมตร ก้านชูอับเรณูเล็ก ยาวกว่าอับเรณู รังไข่มีขนสีทองแดง ก้านเกสรเพศเมียสั้น ยาวประมาณ 1.2 มิลลิเมตร ผลรูปไข่ถึงรูปไข่กลับ หรือค่อนข้างกลม ยาว 1-1.5 เซนติเมตร ค่อนข้างจักเป็นพู 2-5 พู ผลอ่อน มีขนสีออกน้ำตาลแล้วเกลี้ยง ผลแก่ เปลือกบางสุกสีม่วงถึงดำ เมล็ด 1-2(5) เมล็ด พบทั่วไปตามชายฝั่งทะเลที่เป็นหิน หรือทราย ทั่วภาคใต้และลึกเข้ามาจากป่าชายเลนด้วย พบตามเขาหินปูน ป่าดิบที่ต่ำ สูงได้ถึง 200 เมตร



ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, โสมอน ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม 3 (Mo-Z)-กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2561. 880 หน้า

ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์มรดกอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

