

หั้นซ้าง(มะม่วงเลือด)

วงศ์ MYRISTICACEAE

Knema andamanica (Warb.) W.J.de Wilde subsp. *peninsularis* W.J.de Wilde

ไม้ต้น

ขนาดกลาง สูงได้ถึง 8 ม. ลำต้นทรงกระบอก เปลือกเกลี้ยง สีน้ำตาลอมแดง กะเทาะออกเป็นสะเก็ดเล็กน้อย มียางสีแดง กิ่งก้านออกตั้งฉากกับลำต้น



ใบ : เป็นใบเดี่ยว เรียงสลับ ก้านใบ ยาว 7-12 มม. สีน้ำตาลคล้ำ เกลี้ยง เป็นร่องด้านบน แผ่นใบ ขนาด 12-23 x 3.5-7.5 ซม. คล้ายแผ่นหนัง รูปขอบขนานถึงรูปหอก ฐานใบกลม หรือสอบเรียว ปลายใบแหลมถึงเรียวแหลม ขอบใบเรียบ ท้องใบมีนวล เส้นกลางใบ เป็นสันชัดเจนด้านท้องใบ เส้นแขนงใบ 16-20 คู่ เส้นแขนงใบย่อยสานกัน เป็นชั้นบันได

ดอก : ออกเป็นช่อที่ง่ามใบ ก้านช่อไม่มีหรือสั้นมาก มีขนสั้นนุ่มสีสนิม ปกคลุม ดอกย่อยตัวผู้มี 3-5 ดอกต่อช่อ ก้านดอกย่อย เรียว ยาว 4-7.5 มม. มีใบประดับขนาดเล็กที่ก้าน กลีบดอก มี 3 กลีบ หนา มีขนสีสนิม ปกคลุมด้านนอก ด้านในสีเหลือง

ผล : รูปทรงรี ขนาด 2-3 ซม. ขนสีสนิมปกคลุม เมื่อแก่แตกเป็น 2 ซีก มี 1 เมล็ด เยื่อหุ้มเมล็ดสีแดงส้ม



พบในป่าดิบชื้น ระดับต่ำ ในภาคใต้

อ้างอิงข้อมูล : <http://tai2.ntu.edu.tw/taiwania/pdf/tai.2013.58.295.pdf>

ภาพประกอบ : Npic-Surat



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Parks Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)