

*Calamus longisetus* Griff.

ชื่อพื้นเมือง : รอแตงบูโบ (มลายูท้องถิ่น-ยะลา)

หวายขนาดใหญ่ขึ้นเป็นกอ ลำต้น เลื้อยป็นปาย ยาว 10-20 เมตร มีกาบใบกาบหุ้มลำเมื่อสดมีสีเหลืองออกเขียว เมื่อแห้งมีสีน้ำตาล มีหนามรูปสามเหลี่ยมแบน สีน้ำตาลแดงหรือดำ โคนสีเหลืองหรือสีน้ำตาลนูนขึ้นเล็กน้อย หนามมีหลายขนาดขึ้นอย่างหนาแน่น หนามรูปแถบสั้นๆ พบเป็นกระจุก หรือเดี่ยวๆ และมีหนามรูปเข็มแทรกอยู่อย่างหนาแน่น หนามส่วนใหญ่เฉียงลง ปากกาบหุ้มลำมีหนามรูปสามเหลี่ยมกระจายอยู่ห่างๆ ใบใบประกอบแบบขนนก เรียงแบบตรงข้าม แผ่นใบหนา ใบย่อยรูปขอบขนาน มีหนามอยู่ทั่วไป ผิวใบมีหนามสั้นปกคลุม ด้านบนมีหนามรูปขนบนเส้นใบ ด้านล่างมีหนามรูปขนบนเส้นใบช่วงปลาย ขอบใบมีหนามรูปขนแข็ง ปลายใบแหลม ใบย่อยแต่ละข้างของทางใบเรียงตัวเป็นกลุ่มๆ แบบเอียงกันหรือตรงข้ามตรงข้าม ใบกว้าง 2-3 เซนติเมตร ยาว 150-200 เซนติเมตร เส้นใบแตกแบบขนานตามยาว เส้นกลางใบมีหนาม ดอก ออกเป็นช่อช่อดอกยาว 10-15 เซนติเมตร ออกบริเวณซอกกาบใบ ผล ผลเดี่ยว ออกเป็นช่อรูปไข่ ปลายผลแหลมยื่นออกเล็กน้อย ผลอ่อนสีดำปนน้ำตาล ผลแก่สีน้ำตาลปนเหลือง ปลายเมล็ดหุ้มผลมีสีดำสลับกับสีน้ำตาลเป็นแถบขอบเมล็ดมีขนสั้นๆ สีน้ำตาลอ่อนหรือเป็นริ้วๆ ผลสุก กินสด รสหวานฝาด



ข้อมูลอ้างอิง : <https://srdi.yru.ac.th/bccqy/page/759/%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8>

ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

