

ขานาง

Tristaniopsis merguensis (Griff.) Peter G.Wilson & J.T.Waterh.

วงศ์ MYRTACEAE

ชื่ออื่น : กร่าง , ไกร , ไทรกร่าง (กรุงเทพฯ), ไฮฮี (เพชรบูรณ์)



ไม้พุ่มหรือไม้ต้น สูงได้ถึง 15 ม. เปลือกลอกเป็นแผ่น

ใบ : หูใบขนาดเล็ก ร่วงเร็ว ใบรูปไข่ หรือรูปไข่กลับ ยาว 3-10 ซม. แผ่นใบหนา ด้านล่างมีต่อมกระจาย เส้นแขนงใบจำนวนมากเรียงจรดกันเป็นเส้นขอบใน ก้านใบยาว 2-3 มม. มีขนละเอียด



ดอก : ช่อดอกยาวได้ถึง 10 ซม. ใบประดับรูปใบหอก ยาวประมาณ 4 มม. ก้านดอกยาวได้ถึง 2.5 มม. ก้านดอกเทียมยาวประมาณ 1 มม. ฐานดอกรูปกรวย กลีบเลี้ยงขนาดเล็ก ดอกสีขาวหรืออมเหลือง เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2 มม. เกสรเพศผู้เชื่อมติดกัน 5 มัด มัดละ 5-15 อัน ติดตรงข้ามกลีบดอก ก้านชูอับเรณูยาว 1-2.5 มม. โคนมีขน รังไข่มีขนสั้นนุ่มช่วงปลาย ก้านเกสรเพศเมียยาวประมาณ 2 มม.



ผล : รูปรีกว้าง ยาว 1-1.2 ซม.

พบที่หมู่เกาะอันดามัน พม่า กัมพูชา เวียดนาม คาบสมุทรมลายู และบอร์เนียว ในไทย พบกระจายห่าง ๆ ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ ขึ้นตามป่าดิบแล้ง ป่าดิบชื้น ป่าดิบเขา หรือป่าพรุ ความสูงถึงประมาณ 1500 เมตร

อ้างอิงข้อมูล : สำนักงานหอพรรณไม้

ภาพประกอบ : <https://florafauweb.nparks.gov.sg> , ราชนันย์ ภูมา (ภาพดอก เขา 1490 ยะลา); สุคนธ์ทิพย์ ศิริมงคล (ภาพผล ภูวี่ บึงกาฬ)



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Parks Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)