

Celtis timorensis Span.

แก้งขี้พระร่วง

วงศ์ CANNABACEAE (Ulmaceae)

ชื่อพื้นเมือง :

ไม้ต้น กิ่งผลัดใบ สูงได้ถึง 25 ม. เปลือกสีเทา อ่อนถึงน้ำตาลอ่อนเทาหรืออ่อนเขียว เรียบหรือแตกเป็นแผ่น มีช่องอากาศทั่วไป เปลือกในสีเหลือง อ่อน ใน รูบรีกว้างถึงแคบ กว้าง 3-8 ซม. ยาว 8-15 ซม. โคนเป็นรูปไข่ ขอบจักไม่ชัด เนื้อคล้ายหนัง บาง เส้นใบข้าง 1(2) คู่ออกใกล้ปลายใบ ดอกเพศผู้ ออกเป็นช่อเรียว กลีบรวม 5 กลีบ เกสรเพศผู้ 5 อัน ดอกสมบูรณ์เพศ และผลออกเป็นช่อกว้าง ยาวได้ถึง 5 ซม. ผลรูปไข่ กว้าง 0.6 ซม. ยาว 1 ซม. ก้านผลยาวได้ถึง 0.5 ซม. ปลายมีจังอยแหลม ค่อนข้างเป็น 4 มุม พับในภาคอื่น อาจพับในภาคใต้ด้วย



ข้อมูลอ้างอิง : ไอมอน ภารเดนอร์ ทินดา ลินธิลุนฟาร์ ก่อการค้า ขยายอุดuct น้ำปาการได้ เลย – พิมพ์ครั้งที่ 1-กรุงเทพฯ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2558. 768 หน้า

ภาพประกอบ : ศุภชัยวิจัยและพัฒนาวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

