

ไม้ต้น ขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ สูง 10-45 ม. ไม้ผลัดใบ เรือนยอดเป็นพุ่มกลมทึบ หรือแผ่กว้าง เปลือกสีน้ำตาลเข้มปนเทา แตกเป็นร่องลึกหรือล่อนเป็นแผ่น

ใบ : ใบเดี่ยวเรียงเวียนสลับ ใบรูปไข่ หรือรูปไข่แกมขอบขนาน กว้าง 3.5 – 15 ซม. ยาว 6.5 – 26 ซม. ปลายใบมน โคนใบสอบ ผิวใบด้านล่างมากกว่าด้านบน แผ่นใบหนาแข็งและสาก ขอบใบเรียบหรือเป็นคลื่นเล็กน้อย เส้นแขนงใบข้างละ 8 – 18 เส้น เส้นใบเห็นชัดทางด้านล่าง ก้านใบยาว 1 - 4 ซม. มีขน

ดอก : สีเหลือง ออกเป็นช่อแบบช่อกระจุกแน่นหรือเป็นช่อเดี่ยวบริเวณซอกใบ ดอกแยกเพศร่วมต้น ดอกเพศผู้รูปไข่แกมขอบขนานหรือกลมขนาด 1.25-2.5 ซม. ดอกเพศเมียรูปไข่หรือกลม ดอกจำนวนมากเรียงอัดแน่นบนฐานรองดอกอันเดียวกัน ขนาด 1.5-2 ซม. ก้านช่อดอกยาว 1-5 มม.

ผล : ผลสดแบบผลรวม รูปกลมสีเขียวอมเหลือง มีหนามยาวตรงเท่ากัน รอบแผล ผลสุกสีส้มขนาด 10 -15 ซม. มีเนื้อหุ้มเมล็ดสีเหลืองมีรสหวาน ก้านช่อผลยาว 1.5 – 2 ซม. เมล็ดสีน้ำตาลอมส้ม ทรงกลม กว้าง 10 ซม. ยาว 10 ซม. มีเมล็ดจำนวนมากต่อผล

ระยะการเป็นดอก - ผล : ดอก พ.ย. - ม.ค. ผล มี.ค. - พ.ค.

นิเวศวิทยา : ป่าดิบเขา



การใช้งานด้านภูมิทัศน์ : ใบใหญ่ ทรงพุ่มใบทึบและมียางขาว ควรปลูกในสวนป่า

ประโยชน์ : ผลเป็นอาหารของสัตว์และนกได้

อ้างอิงข้อมูล : เอี่ยมพร วิสมหมายม, ปณิธาน แก้วดวงเทียน. ไม้ป่ายืนต้นของไทย 1. ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ เอช เอ็น กรุ๊ป จำกัด ; 2552 (หน้า 100)

ภาพประกอบ : Flickr by Ahmad Fuad Morad, Flickr by LIChieh Pan

