

เข็มพระราม

Chassalia curviflora (Wall.) Thwaites
วงศ์ RUBIACEAE

ไม้พุ่ม สูง 1-3 ม.



ใบ : ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปหอก หรือรูปหอกแกมรูปไข่ ยาว 7.5-21.5 ซม กว้าง 2-7.5 ซม. ฐานสอบเรียว ปลายเรียวแหลม เป็นทางโค้ง ขอบเรียบหรือเป็นคลื่นเล็กน้อย เนื้อใบบาง คล้ายกระดาษ ก้านใบยาว 0.6-4.6 มม.



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Parks Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

ดอก : ดอกแบบช่อแยกแขนง ออกที่ปลายยอด กลีบเลี้ยง มี 5 กลีบ โคนเชื่อมกันเป็นหลอดยาว กลีบดอก มี 5 กลีบ สีขาวอมม่วง โคนเชื่อมกันเป็นหลอด โคน มีสัน เกสรเพศผู้ มี 5 อัน ติดที่รอยต่อของแฉกกลีบดอก เกสรเพศเมียแยกเป็น 2 แฉก



ผล : ผลทรงกลม ผลสุกมีสีน้ำตาลแก่หรือสีดำ



นิเวศวิทยา : พบในป่าดิบแล้ง ต่างประเทศพบที่อินเดีย ศรีลังกา จีน เกาะบอร์เนียว