

เชิงหลวง

Caryota maxima Blume ex Mart.

วงศ์ ARECACEAE

ชื่ออื่น : เชิงใหญ่ , จอย , เต่าร้างดอย , เต่าร้างยักษ์,

ปาล์มลำต้นเดี่ยว สูงได้ถึง 30 ม. ลำต้นเส้นผ่านศูนย์กลาง 25-45 ซม.



ใบ : ก้านใบยาว 10-50 ซม. แกนกลางใบประกอบยาว 2.5-5 ม. ใบประกอบย่อยข้างละ 15-27 ใบ ห้อยลง ใบประกอบย่อยชั้นที่สองข้างละ 15-30 ใบ ใบย่อยเรียวยาวได้ถึง 35 ซม. ขอบจักลึก ซ่อดอกมี 3-5 ซ่อ ห้อยลง ก้านช่อยาว 1-1.5 ม. แกนกลางยาว 1.5-3 ม. ซ่อย่อยจำนวนมาก แกนกลางยาว 1-2 ม.





ดอก : ดอกเพศผู้กลีบดอกยาว 1.2-1.5 มม. ดอกเพศเมียกลีบดอกยาว 6-8 มม.



ผล : ผลเส้นผ่านศูนย์กลาง 2-2.5 ซม.
 สุกสีส้มอมแดง ส่วนมากมีเมล็ดเดี่ยว
 เนื้อในเมล็ดเป็นชั้น

นิเวศวิทยา : พบที่อินเดีย ภูฏาน พม่า จีนตอนใต้ ลาว เวียดนาม คาบสมุทรมลายู ชวา และสุมาตรา ในไทยพบกระจายห่าง ๆ ทุกภาค ขึ้นตามป่าดิบแล้ง ป่าดิบเขา และป่าดิบชื้น มักพบตามพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม ความสูงถึงประมาณ 1800 เมตร

อ้างอิงข้อมูล : <http://www.dnp.go.th/botany/> (สำนักงานหอพรรณไม้)

ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย เต็ม สมิตินันท์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2557 กรุงเทพฯ : สำนักงานหอพรรณไม้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2557 (หน้า 115)

ภาพประกอบ : Flickr by Ahmad Fuad Morad, www.fca16mr.com, <http://idtools.org>