



## ไม้ต้น

ไม้ผลัดใบ สูงถึง 28 ม. เรือนยอดแคบแน่น โคนต้นมีพูพอนสั้น เปลือกสีครีมถึงสีน้ำตาลอมเทา แตกเป็นแผ่นและเกล็ด มียางดำแฉก เปลือกในสีชมพูถึงแดงเข้ม พบบางสีออกเหลือง สีจะค่อยๆ ซีดลงเป็นสีส้มอ่อนเมื่อเข้าใกล้เนื้อไม้ มียางใสหรือสีขาวแทรกอยู่

**ใบ** มีใบย่อย 3-6 คู่ รูปไข่ถึงขอบขนานแกมรี กว้าง 3-8(10) ซม. ยาว 7-18(25) ซม. ปลายแหลมเป็นติ่งเรียวยาว 1-2 ซม. โคนรูปกลมหรือกลมเบี้ยว เนื้อบางแต่แข็ง สีเขียวเข้มด้านบน ด้านล่างสีเขียวเกลี้ยง ใบแห้งสีน้ำตาลออกแดงหรือน้ำตาล เส้นกลางใบบนทั้งสองด้าน เส้นใบ 7-14 คู่ ค่อนข้างตรง แล้วโค้งที่ใกล้ขอบ ฐานด้านล่าง เส้นใบย่อยเป็นร่างแหละเอียด ฐานทั้งสองด้าน บางที่ที่ต่อมปลายสุดมีต่อมเล็ก ก้านใบย่อยเล็กยาว 1-3 ซม. (ใบปลายยาวถึง 5 ซม.) บวมที่ปลายทั้งสองด้าน ก้านข้อใบยาว 6-18 ซม. สีออกน้ำตาล มักบวมและแบนที่โคน ตามข้อบวม กิ่งเล็กถึงหนา (เส้นผ่าศูนย์กลาง 4-10 มม.) สีน้ำตาลเข้ม เกลี้ยง ยกเว้นปลาย



**ดอก** ขนาด 4 -6 มม. สีขาวอมเขียว เป็นช่อสั้นแตกแขนงยาวถึง 35 ซม. ตามซอกใบใกล้ปลายกิ่งหรือเป็นกลุ่มใกล้ปลายยอด มีขนแล้วเกลี้ยง กลีบเลี้ยงและกลีบดอก มีขนทั้งสองด้าน ดอกเพศผู้ ขนาด 1.2 ซม. กลีบเลี้ยงยาว 2 มม. เกสรเพศผู้ไม่เท่ากัน อันที่ติดตรงกับกลีบเลี้ยง 3 อัน จะยาวกว่าอีก 3 อันที่ติดอยู่บนจานฐานดอกคล้ายนมจ๊กตีน 6 พู เกสรเพศเมียเป็นหมันลดรูป ดอกเพศเมียมีกลีบเลี้ยงยาว 1.5-2 มม. รูปถ้วยจ๊กตีน 6 พู



**ผล** รูปไข่ถึงขอบขนานกว้าง 0.7-1.8 ซม. ยาว 1.8-35 ซม. ปลายทู่หรือแหลมเบี้ยว แก่สีเหลืองถึงสีดำอมม่วง ส่วนของดอกค่อนข้างติดทน ค่อนข้างเป็นสามเหลี่ยมทู่ เมื่อตัดขวาง มีขนสีน้ำตาลโดยเฉพาะใกล้ปลาย กลีบเลี้ยง 2 ซม. คล้ายจานรองถ้วยจ๊ก 3 พู

พบในป่าดิบสูง 400 ม. ที่ จ.ระนอง สตูล

อ้างอิงข้อมูล : ไชมอน การ์ดเนอร์ พินดา สิทธิสุนทร และก่องกานดา ชยามฤต. ไม้ป่าภาคใต้เล่ม 1. ครั้งที่ 1 กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ ; 2559 (หน้า 280)

ภาพประกอบ : N-pic Surat, Photograph by Deby Arifiani

