

คอแลน(คอแลนเข้า)

Xerospermum laevigatum Radlk.

SAPINDACEAE

ชื่ออื่น :

คอแลนเป็นไม้ต้น สูงถึง 36 ม. เปลือกเรียบ หรือร่อนเป็นสะเก็ดใหญ่ สีน้ำตาลเทา มีช่องระบายน้ำ
ใน ประกอบแบบขนนก เรียงสลับ มีใบย่อย 1–2(–3) คู่ เรียงตรงข้าม บางครั้งเยื้องกัน แผ่นใบยื่อยรูปไข่กลมรี
กว้าง 2–10 ซม. ยาว 4–20 ซม. ปลายป้าน ถึงแหลม หรือเรียวแหลม โคนแหลม ถึงป้าน ผิวใบเกลี้ยงทั้งสอง
ด้าน ดอก เล็ก สีขาว ออกเป็นช่อยาวถึง 12 ซม. ผล รูปกลม ถึงรูปกลมรี กว้าง 1.5–3 ซม. ยาว 2.5–4 ซม.
เปลือกเป็นตุ่มยาวคล้ายหนามอ่อนปลายแหลมทั่วทั้งผล เมื่อสุกสีเหลือง สีส้ม หรือสีชมพู เม็ดมีเยื่อหุ้ม

คอแลนมีการกระจายพันธุ์ในภาคใต้ ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ ที่ความสูงตั้งแต่ระดับทะเลไปกลางถึง
700 ม. ออกดอกเดือนกุมภาพันธ์–มีนาคม ผลแก่เดือนพฤษภาคม–ธันวาคม เยื่อหุ้มเมล็ดระหว่างอมเปรี้ยว
กินได้



Photo by Aroon Sinbumroong

ข้อมูลอ้างอิง : http://www.dnp.go.th/Pattani_botany/

ภาพประกอบ : ภาพใบ : สุวนิจัยและพัฒนาวิศวกรรมอุตสาหกรรมแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภาพผล : Aroon Sinbumroong



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

