

# เครือออน

*Congea tomentosa* Roxb.

วงศ์ LAMIACEAE

ชื่ออื่น : ออนแดง (เชียงใหม่), ค้างเบี้ย เบี้ย (นครพนม), พลุหีบ ล้วงสู่มขาว ล้วงสู่มตัวผู้ (นครราชสีมา), สะแกบ (อุดรธานี), งวงซุม (เลย), จั่งบั้ง ท้องปลิง (จันทบุรี), สังขยา (พิษณุโลก, สงขลา), พญาโจร พวงประดิษฐ์ (กรุงเทพฯ), กาใบดง

**ไม้เถา** เนื้อแข็งเลื้อยพันต้นไม้อื่น สามารถเลื้อยไปได้ไกล 10-15 ม. มีอายุหลายปี ปลายกิ่งทอดห้อยลง ตามลำต้น และกิ่งก้านมีขนละเอียดนุ่มสีขาวขึ้นหนาแน่น



**ใบ** : ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงตรงข้าม ลักษณะของใบเป็นรูปไข่แกมวงรี ปลายใบแหลมเป็นติ่งสั้น โคนใบมน ส่วนขอบใบเรียบ ใบมีขนาดกว้างประมาณ 4-5 ซม. และยาวประมาณ 6-13 ซม. เนื้อใบสาก ท้องใบมีขนขึ้นหนาแน่น ผลัดใบในช่วง ธ.ค.-เม.ย.





**ดอก :** เป็นช่อตามปลายกิ่ง ช่อดอกประกอบด้วยช่อย่อยเป็นกระจุก มีดอกประมาณ 5-7 ดอก ช่อหนึ่งยาวได้ประมาณ 10-18 นิ้ว มีใบประดับสีม่วงอมชมพูรองรับ 3 ใบ ลักษณะของใบเป็นรูปไข่กลับแกมขอบขนาน มีขนาดกว้างประมาณ 0.8 ซม. และยาวประมาณ 2.5 ซม. โคนเชื่อมติดกัน ดอกย่อยเป็นสีขาวขนาดเล็ก หลุดร่วงได้ง่าย กลีบดอกส่วนโคนเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยกออกเป็น 2 ปาก ขนาดไม่เท่ากัน แบ่งเป็นส่วนบน 2 กลีบ ส่วนล่างอีก 3 กลีบ กลีบรองกลีบดอกมี 5 แฉก ติดอยู่เมื่อเป็นผล มีเกสรเพศผู้ 4 อัน ออกดอกช่วงเดือน ธ.ค.-เม.ย.



**ผล :** ผลสด ลักษณะของผลเป็นรูปไข่กลับ ผลมีขนาดเล็ก มีใบประดับติดอยู่ที่ขั้ว ภายในผลมีเมล็ด 1 เมล็ด ออกดอกและติดผลในช่วงประมาณเดือน ธ.ค.-เม.ย.

มีถิ่นกำเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบขึ้นตามป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรัง