

กระดังงาเขา

Hubera jenkinsii (Hook. F. & Thomson) Chaowasku
วงศ์ ANNONACEAE

ไม้ต้น ขนาดกลาง สูง 10-20 ม. เปลือกเรียบ สีน้ำตาลเข้ม หรือน้ำตาลดำ เมื่อกะเทาะหรือลอกออกมีสีน้ำตาลอมเหลือง เปลือกหนา 0.4-0.7 ซม. โคนต้นมักเป็นร่อง กิ่งที่แตกออกจาก ลำต้นยืนยาว กิ่งอ่อนมีขนสั้นนุ่มสีน้ำตาลสนิมปกคลุม และเกลี้ยงเมื่อแก่ ใบเดี่ยว ออกสลับ ใบรูปขอบขนานแกมรูปหอก หรือรูปรี หรือรูปขอบขนานแคบๆ ขนาด กว้าง 4-6.5 ซม. ยาว 10-22 ซม. ฐานใบรูปลิ้นถึงแหลม ขอบใบเรียบ ปลายใบแหลมถึงเรียวแหลม แผ่นใบคล้ายกระดาษ หรือคล้าย พังผืด หลังใบสีเขียวเข้ม เกลี้ยง มีขนละเอียดบนเส้นกลางใบ ท้องใบสีเขียวซีดกว่า เกลี้ยง มีขนสั้นนุ่มที่เส้นกลางใบ และเส้นแขนงใบ เส้นแขนงใบ 6-8 คู่ เส้นแขนงเชื่อมต่อกัน ก่อนถึงขอบใบ เป็นร่องด้านหลังใบ และนูนด้านท้องใบ ก้านใบยาว 0.5-0.8 ซม. มีขนละเอียดปกคลุม ดอก เป็นแบบ สมบูรณ์เพศ ออกตามซอกใบ มักเป็นดอกเดี่ยว สีขาวครีม หรือสีเหลืองซีดๆ ก้านดอกรูปเรียวยาวฐานกว้างปลายแคบ ยาว 1-2 ซม. มีขนสั้นหนานุ่มสีน้ำตาลสนิมปกคลุม ใบประดับออกจากฐานดอก เป็นเกล็ดสั้นๆ ร่วงหลุดง่าย



กลีบเลี้ยง 3 กลีบ รูปไข่กว้างหรือรูปเกือบกลม ปลายกลีบแหลม กว้าง 0.2-0.4 ซม. ยาว 0.3-0.5 ซม. กลีบดอก 6 กลีบ เรียงเป็น 2 วง โคนกลีบจรดกัน มีขนาดใกล้เคียงกัน กว้าง 1.5-2 ซม. ยาว 3.5-4.5 ซม. รูปหอกกว้าง ฐานกลีบสอบแคบ ปลายกลีบมน แผ่นกลีบคล้ายแผ่นหนัง มีเส้นแขนงกลีบดอกจางๆ พาดตามยาว เกลี้ยงหรืออาจมีขนสั้นนุ่มปกคลุม ผล ออกเป็นกลุ่มมีหลายผลย่อย ก้านผลย่อย ลักษณะอ้วนสั้น ยาวประมาณ 1.5 ซม. ผลย่อย รูปทรงรี หรือรูปขอบขนาน ยาวประมาณ 1.5 ซม. สีเขียวมีลักษณะคล้ายแปรงปกคลุม ผลสุกสีแดง ผลย่อยมี 1 เมล็ด สีน้ำตาลเข้ม ผิวเรียบ



อ้างอิงข้อมูล : <http://indiabiodiversity.org/species/show/268066>

ภาพประกอบ : N-Pic Surat



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Parks Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)