

กระเบาน้อย

Hydnocarpus nanus King
วงศ์ ACHARIACEAE

ไม้พุ่มหรือไม้ต้นขนาดเล็ก สูงถึง 6 ม. มักมีลำต้นเดี่ยว เปลือกสีครีมถึงเทาเข้ม
เกลี้ยง เปลือกในสีขาว มีเส้นใย ใบรูปไข่แคบถึงรูปใบหอกแกมขอบขนาน กว้าง 2-4 ซม. ยาว 7-12 ซม.
ปลายเรียวแหลม โคนเล็กน้อยใกล้ยอด โคนเบี้ยวซัด แผลมหรือกลม ขอบจักซี่ฟันตื้น ยอดอ่อนมีขนยาวสีสนิม
ใบแก่บาง มีขนอย่างน้อยบนเส้นใบ บางครั้งเกือบเกลี้ยง เส้นใบ 5-8 คู่ โคนเชื่อมกันเป็นวงใกล้ขอบ หนูน
ซัดด้านล่าง เส้นใบย่อยค่อนข้างเป็นชั้นบันได ก้านใบยาว 0.3-0.8 ซม. มีขน หูใบยาว 5-7 มม. ค่อนข้าง
ติดทน ดอกเล็กสีขาว ออกเดี่ยวหรือเป็นช่อ มีดอกน้อย ออกเหนือซอกใบ 2-3 มม. กลีบเลี้ยงกลม 5 กลีบ
ขนาดประมาณ 2 มม. ค่อนข้างเกลี้ยง กลีบดอก 5 กลีบ ยาว 1.5 มม. รูปขอบขนาน



อ้างอิงข้อมูล : ไชมอน การ์ดเนอร์ พินดา สิทธิสุนทร และก่องกานดา ชยามฤต. ไม้ป่าภาคใต้เล่ม 1. ครั้งที่ 1 กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ ; 2559 (หน้า 39)

ภาพประกอบ : ^๑Npic-surat



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Parks Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)