

# กรวยป่าใต้

*Casearia grewiifolia* Vent.

วงศ์ SALICACEAE

**ชื่ออื่น** ก้วย ผีเสื้อหลวง สีเสื้อหลวง (ภาคเหนือ), ขุนเหียง บุนเหียง (สกลนคร), คอแลน (นครราชสีมา), ตวย (เพชรบูรณ์), ตวยใหญ่ ตานเสียน (พิษณุโลก), ผ่าสาม (นครพนม, อุตรธานี)

**ไม้ต้น** ขนาดเล็ก ผลัดใบ สูง 5-15 ม. ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปขอบขนานหรือรูปขอบขนานแกมรูปไข่ ปลายแหลม โคนมนกว้าง มักเว้าเล็กน้อยที่รอยต่อก้านใบ ขอบจักถี่ แผ่นใบด้านบนเกลี้ยงหรือมีขนเล็กน้อยที่เส้นกลางใบ ด้านล่างมีขนนุ่มทั่วไป ดอกมีจำนวนมาก ออกเป็นกระจุกเล็กๆ ตามง่ามใบที่ใบร่วงไปแล้ว ดอกสมบูรณ์เพศ สีขาวหรือเหลืองอมเขียว กลีบเลี้ยงเล็ก ไม่มีกลีบดอก เกสรเพศผู้ 8-10 อัน ผลมีเนื้อ รูปไข่ ผิวเรียบ ผงหนา สุกสีเหลือง เนื้อหุ้มเมล็ดสีแดง



พม่า คาบสมุทรมอินโดจีน มาเลเซีย ในประเทศไทยพบที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน พิษณุโลก นครสวรรค์ เลย ขอนแก่น อุบลราชธานี กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ จันทบุรี และชุมพร พบตามป่าเต็งรังที่ถูกรบกวน บนดินเหนียวหรือบนหินปูน ระดับความสูง 0-1000 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล

อ้างอิงข้อมูล : [http://www.qsbg.org/database/botanic\\_book%20full%20option/search.asp?txtsearch=%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2](http://www.qsbg.org/database/botanic_book%20full%20option/search.asp?txtsearch=%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2)

ภาพประกอบ : N-pic Surat, www.qsbg.org



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
National Parks Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)