

ลิเกาป่า

Lygodium polystachyum Wall. Ex Moore

วงศ์ LYGODIACEAE

ชื่ออื่น : กูดเครือ , กูดก้อง(น่าน) , กูดงอดแงต , กูดแพะ , กูดย่อง , ผักตีน ตักโต (เหนือ); หมอยยายชี(สท), ลิเกาย่อง (สุราษฎร์ธานี)



เฟิน ลำต้นเป็นเหง้าสั้น มีขนสีน้ำตาลเข้มหนาแน่น ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3-6 มม. ไม่มีเกล็ด ลำต้นเมื่อแก่มีสีดำเป็นมัน



ใบ : ใบประกอบแบบขนนกสองชั้น แกนกลางมีลักษณะเป็นเถาเลื้อย แกนกลางใบประกอบชั้นที่หนึ่งชัดเจน โคนก้านใบสีน้ำตาล ส่วนบนสีเหลืองน้ำตาล มีขนสีน้ำตาล มีปีกแผ่ยื่นออกมาไม่ชัดเจนหรือไม่มี ใบย่อยเรียงแบบสลับบนแกนกลางของใบ ใบย่อยที่ไม่สร้างสปอร์ ก้านใบย่อยยาว 2-4 มม. แผ่นใบย่อยรูปหอก ยาว 4-7 ซม. กว้าง 1-2 ซม. ฐานใบรูปหัวใจ ปลายใบมนหรือแหลม ขอบใบหยักเว้าเป็นฟันปลา ผิวใบมีขนใส แผ่นใบบางคล้ายกระดาษ ผิวใบด้านบนเกลี้ยง ด้านล่างมีขนประปรายตามเส้นใบ ใบย่อยที่สร้างสปอร์ อยู่กลางเถาขึ้นไป แอนนูลัสประกอบด้วยเซลล์เพียงแถวเดียว เรียงตัวในแนวขวาง และอยู่ตรงยอดของอับสปอร์ เยื่อคลุมกลุ่มอับสปอร์เทียม มีลักษณะ เป็นถุงเรียงซ้อนกัน และมีขนใส กลุ่มสปอร์เกิดที่ขอบใบย่อย ยาวได้ถึง 1 ซม. กว้าง 1.5 มม.



พบตามป่าเขาทั่วไป ป่าผลัดใบ หรือป่าดงดิบ ป่าเบญจพรรณ และป่าผลัดใบผสมทุกภาคของประเทศไทย ใบอ่อนละเอียดอ่อนใช้ประกอบอาหาร เช่นแกง ผัด หรือต้ม ต้นใช้ทำเชือกสานทำกระเป่า ตะกร้า

อ้างอิงข้อมูล : <http://www2.phrae.mju.ac.th/cms/rspg/index.php/2014-07-08-09-10-44/48-2014-07-08-08-11-02>

ภาพประกอบ : <http://rbg-web2.rbge.org.uk>



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Parks Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)