

มะเมาะขน

Antidesma velutinum Tul.

วงศ์ PHYLLANTHACEAE

ชื่ออื่น : มะเมาะ (สตูล) มะเมาะหิน (ชุมพร) เมาโปโล (สุราษฎร์ธานี ตรัง)

ไม้พุ่มหรือไม้ต้น

ขนาดเล็ก สูงได้ถึง 20 ม. ใบเดี่ยว รูปรี หรือรูปขอบขนานแคบ กว้าง 3-6 ซม. ยาว 9-15 ซม. ปลายใบเรียวแหลม โคนใบสอบ ขอบใบเรียบ ดอกแยกเพศอยู่บนต้นเดียวกัน ช่อดอกเพศผู้ ยาว 3-13 ซม. มีขนสั้นนุ่ม ดอกเพศผู้ขนาดเล็ก จำนวนมาก เกสรเพศผู้ 3-6 อัน เกสรเพศเมียเป็นหมัน ช่อดอกเพศเมียออกตามซอกใบ หรือออกติดกันแน่นที่ปลายยอด ดอกเพศเมียขนาดเล็ก กลีบเลี้ยงรูปถ้วย 3-6 กลีบ รั้งไข่เหนืองกลีบ ยอดเกสรเพศเมียมี 3-6 แฉก ผลออกเป็นช่อยาว 16-20 ซม. ผลรูปรี หรือกลมแบน



นิเวศวิทยา : ขึ้นในป่าดิบและป่าผลัดใบ ต่างประเทศ พบในอินเดีย จีนตอนใต้ ภูมิภาคอินโดจีน ภูมิภาคมาเลเซีย ออสเตรเลีย

อ้างอิงข้อมูล : http://biodiversity.forest.go.th/index.php?option=com_dofplant&view=showone&id=1157

ภาพประกอบ : Npic-surat



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Parks Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)