

พินจำ

Vatica odorata (Griff.) Symington
วงศ์ DIPTEROCARPACEAE



ไม้ต้น

ขนาดกลาง สูงถึง 20 ม. ไม้ผลัดใบ ลำต้นเปลาตรง มักแตกกิ่งต่ำ เปลือกสีน้ำตาลเรียบ และมีสันตาม แนวขวางสลับ มักมีชั้นสีเหลืองใสปรากฏ เปลือกในสีเหลืองอ่อน กิ่งอ่อน มีขนสีสนิม เนื้อไม้สีเหลืองอ่อน



ใบ : รูปรี รูปไข่แกมขอบขนานถึงรูปรีแกมรูปขอบขนานปลายใบทู่หรือเรียวแหลม โคนใบสอบหรือมน แผ่นใบค่อนข้างหนา เกือบ

ผล : เมล็ดรูปค่อนข้างกลม มีขนหนาแน่น มีปีกใหญ่ และยาว 2 ปีก และปีกเล็กสั้น 3 ปีก ปีกยาว ยาวถึง 7 ซม. มีเส้นตามยาว 5 เส้น ส่วนปีกสั้นยาว 1 ซม.

ดอก : กลีบเลี้ยงยาว 2 กลีบ และสั้น 3 กลีบ มีขนหนาแน่น กลีบดอกสีขาว ปลายบิดเล็กน้อย

พินจำพบขึ้นในป่าดิบแล้งหรือหากพบในป่าดิบชื้นมักพบขึ้นอยู่ตามสันเขาหรือที่ลาดชันมาก ที่ระดับความสูงไม่เกิน 1,000 ม. จากระดับน้ำทะเล



อ้างอิงข้อมูล : วรรณรัตน์ แจ่มจรรย์, นันวรรณ สุป็นดี, นัยนา เทศนา, สุคนธ์ทิพย์ ศิริมงคล, โสมนัสสา แสงฤทธิ์, กนกอร บุญพา, มานพ ผู้พัฒน์, และ สุคติ เรืองเรือ. พรรณไม้ในอุทยานแห่งชาติเขาลง. ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : สำนักอุทยานแห่งชาติ ; 2558.
ภาพประกอบ : Npic-Surat, สารานุกรมพืช



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Parks Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)