

ชื่อพื้นเมือง :

ไม้ต้นเล็ก ไม่ผลัดใบ (พบน้องสูงได้ถึง 30 ม.) ลำต้นตรงหรือคดงอ มักมีพุพอนเล็กๆ เปเลือก สีน้ำตาล อมเทา แตกเป็นแผ่นเล็ก ใน กว้าง 4-7 ซม. ยาว 12-14 ซม. ออกสับ ดอกกลับปaley กิ่ง รูปรีถึงขอบขนาน สองเรียวไปยังปลายทั้งสองด้าน ขอบเรียบ ใบแก่เนื้อคล้ายหนัง มักมีขนสีสนิมกระจายด้านล่าง บางที่มีต่อมกลมทั้งสองด้าน มีมากที่ครึ่งล่าง เส้นกลางใบ 1 เส้น เส้นใบข้าง 8-15 คู่ เส้นใบอยู่เป็นขั้นบันไดเห็นได้ชัด ก้านใบยาว 2-4 ซม. ป่องชัดที่ปลายใบ มีขนกำมะยี่ หูใบเล็ก กิ่งใหญ่คล้า มีขนกำมะยี่ ดอก สีเหลืองอมเขียว อ่อน แยกเพศ ดอกเพศผู้และเพศเมียอยู่ต่างต้น เป็นช่อไม่แตกแขนงหรือแตกแขนงแคบ ยาวได้ถึง 10 ซม. ตามซอกใบ มีขนสีน้ำตาลอ่อน ไม่มีกลีบดอก ดอกเพศผู้(ในไทยพบเฉพาะตากอก) กลีบเลี้ยงคล้ายในดอกเพศเมียขนสีน้ำตาลแน่นโดยเฉพาะด้านนอก เกสรเพศผู้แยกจำนวนมาก อยู่ชิดกันเป็นกลุ่มบนฐานดอกนูน แทรกอยู่กับต่อมนุ่มเล็กๆจำนวนมาก ไม่มีฐานฐานดอกและรังไข่เป็นหมัน ดอกเพศเมียไม่มีก้าน ดอกหรือก้านดอกยาวได้ถึง 3 มม. กลีบเลี้ยง 5-6 กลีบ ไม่เท่ากัน รูปสามเหลี่ยมหรือรูปไข่ ไม่ซ้อนกันหนาและมีขนจำนวนฐานดอกเป็นวงแหวน แคบ มีขนแน่น มียอดเกสรเพศเมียอยู่(3)2-4 อัน โโค้ง ยาว 1.5 มม. โคนเชื่อมกันเล็กน้อย รังไข่ส่วนมากมี 3 ช่อง ผล ยาว 1.7-3.3 ซม. ก้านผลใหญ่ล่างกลมหรือคล้ายลูกพรุ แบบตามยาว สมมาตรด้านข้าง ยื่นเป็นแนวยาวมีขั้นสีน้ำตาลเข้มแน่น แก่แตก เมล็ดยาว 13 มม. พบน้อยในป่าดิบ สูงได้ถึง 800 ม. จ. นครศรีธรรมราช พัทลุง



ข้อมูลอ้างอิง : ใจอน การ์เดนริพ ศินดา สิงโตสุนทร กองการค่า ขยายตื้อ น้ำป่าภาคใต้ – ชนบทชั้นที่ 1-กรุงเทพฯ :โครงการจัดซื้อที่ดิน 2559. 792 หน้า
ภาษาประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

