

ไม้พุ่มหรือไม้ต้นเล็ก

ผลัดใบหรือกึ่งผลัดใบสูง 3-10(15) ม. เปลือก สีน้ำตาลอ่อนหรือออกเทา มีช่องอากาศใหญ่สีน้ำตาลอมแดง ทัวไปหรือแตกละเอียด

ใบ กว้าง 5-12 ซม. ยาว 12-22 ซม. ในต้นอ่อนขนาดใหญ่กว่า เป็นใบเดี่ยว ออกสลับเวียน แต่มักออกเป็นกระจุกคล้ายเรียงเป็นวงรอบ รูปขอบขนานแกมรี ถึงรูปขนานแกมรูปไข่กลับ ปลายแหลมสั้นหรือเรียวแหลม โคนทู่ถึงกลมหรือรูปหัวใจตื้น ใบอ่อนมีขนรูป ดาวสีน้ำตาลอมทองแน่น ใบแก่มีขนสั้นสีน้ำตาล โดยเฉพาะ

บนเส้นใบด้านบน ด้านล่างมีขนขุยแน่น ไม่เป็นนวล เส้นใบ 1 หรือ 3 เส้น เส้นข้างสั้นมาก เส้นใบข้าง



ดอก ยาว 1-1.5 ซม. บางทีสีครีมตรงกลางสีแดง หรือโดยทั่วไปสีแดงเข้ม ออกเป็นช่อห้อยเล็กเรียว ยาว 8-25 ซม. ตามซอกใบบนๆ และใกล้ปลายกิ่ง ก้านดอกยาว 0.5-1.5 ซม. เล็กเรียว กลีบเลี้ยงรูประฆัง ปลายจักลึกมากกว่าหรือเทียบเท่า 1/2 ของกลีบ เป็นแฉกแคบ 5 แฉก โคนงอและปลายตะก้น ต่อไปแยกจากกันและบานออก มีขนแน่นด้านนอกและบนทุกกลีบด้านใน หลอดกลีบด้านในเกลี้ยง ดอกเพศผู้มีเกสรเพศผู้สมบูรณ์ 10 อัน ดอกเพศเมีย มีเส้าเกสรเกลี้ยง เกสรเพศเมีย มี 5 อัน ขนแน่น ก้านเกสรเพศเมีย มีขน ยอดเกสรเพศเมีย จัก 5 พู

ผล กว้าง 2.4 ซม. ยาว 4-8 (10) ซม. ออกเป็นกลุ่มแผ่กางออก มี 2-3(5) ผลที่ปลายก้านช่อที่ห้อยลง รูปรี ปลายโค้ง สีเหลืองอ่อนแก่สีแดงอมส้ม เป็นมัน มีขนกำมะหยี่ด้านนอก ด้านใน เกลี้ยงและมีสีชมพู เมล็ดมี 3-8 เมล็ด สีดำมัน ยาว 1 -1.5 ซม.



พบทั่วไปในภาคใต้ ตามป่าผลัดใบ ป่ารุ่นและป่าค่อนข้างเปิดทั่วๆไป ในหนังสือ Flora ของ มาเลเซีย แยกออกเป็นหลายชนิด โดยต่างกันว่าเนื้อใบ ความยาวของก้านใบ ขนาดและการติดทนของหูใบ ขนาดและรูปร่างของผล แบบที่พบทั่วไปในภาคใต้

อ้างอิงข้อมูล : ไชมอน การ์ดเนอร์ พินดา สิทธิสุนทร และก้องกานดา ชยามฤต. ไม้ป่าภาคใต้เล่ม 2. ครั้งที่ 1 กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ ;2559 (หน้า 1168)

ภาพประกอบ : N-PIC Surat, Flickr by Ajith Karunaratne

