

# *Aporosa planchoniana* Baill. ex Muell. Arg.

พริกไทยดง

PHYLLANTHACEAE

ชื่ออื่น ๆ :

ไม้พุ่มหรือไม้ต้นเล็ก สูงได้ถึง 10 ม. ใน กว้าง 2-3.5 ซม. ยาว 6-12 ซม. รูปไข่ พับบ้างที่เป็นรูประ ปลายแหลมสั้น โคนแหลมหรือรูปคลิม ขอบไม่จักหรือจักซี่ฟันกลมตื้น ยอดอ่อนมีขนนุ่มหนาแน่น ใบแก่เนื้อบางคล้ายกระดาษ เกลี้ยง ด้านบนมีต่อมสีเข้มที่โคนใบ และต่อมเล็กๆสีเพ้มทั่วไป ด้านล่างมีต่อมรูปจานอยู่ในเวเส้นใบ และต่อมสีเข้มอยู่ตามขอบใบ เส้นใบ 9-11 คู่ นูนทึบสองด้าน ก้านใบยาว 0.3-0.8 ซม. ป่องชัดที่ปลายและโคน ทุ่นใบรูปสามเหลี่ยม กว้างประมาณ 1.5 มม. ยาวประมาณ 3 มม. ร่วงเร็ว ดอกเพศผู้สีขาวหรือสีเหลือง ขนาด 0.5-1 มม. ออกเป็นช่อยาว 1.2-3.7 ซม. มีดอก 4-6 อยู่เป็นกลุ่มบนแกนกลางดอก ไม่มีก้านดอก มี 1-5 ช่อ อยู่ด้วยกันตามซอกใบ กลีบเลี้ยง 3-6 (มักมี 4) กลีบ แยกจากกัน ยาว 0.4-0.8 มม. เกสรเพศผู้มี 2 อัน ยาว 0.5-1.2 มม. โผล่พ้นกลีบเลี้ยงเล็กน้อย รังไข่เป็นหมัน เห็นไม่ชัด ดอกเพศเมียขนาด 3-5 มม. สีเขียวอมเหลือง ออกเป็นช่อยาว 0.3-0.6 ซม. มีถึง 9 ดอก ดอกไม่มีก้านดอก มี 1 หรือ 2 ช่ออยู่ด้วยกันตามซอกใบ แกนกลางดอกมีขนละเอียดสีแดงหนาแน่น กลีบเลี้ยงมี 3-4 กลีบ ยาว 0.4-0.7 มม. ตั้งขึ้น บางที่มีเกสรเพศผู้เป็นหมัน 2 อัน รังไข่ 2 ช่อง ขนาด 2-3.5 มม. ยอดเกสรเพศเมียยาว 0.5-1 มม. ปลายจักเป็นจ่ำนเล็กถึงครึ่งหนึ่งของความยาว ผล ขนาด 0.7-1.1 ซม. รูปไข่ถึงรี ปลายมีจังอย โคนแคบคล้ายก้านสั้น ด้านนอกเกลี้ยง แต่ละส่วนด้านในและแกนกลางผลมีขนเส้นไหมเล็กน้อย เมล็ดขนาด 5-7.5 มม. พบรากุ่นหรือป่าดิบที่ถูกกรบกวน สูงได้ถึง 400 ม. มักพบในที่ค่อนข้างเปิดโล่ง พบรังแท้ จ.ตรัง ขึ้นมา



ข้อมูลอ้างอิง : การค้นอย่าง, ใหม่อน โนปากาคได เล่ม 3 (Mo-Z).-กรุงเทพฯ : อิมแพ็คพับลิชิ่ง, จำกัด (มหาชน), 2561. 880 หน้า

ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

