

# พริกนกขน

*Orophea cuneiformis* King  
วงศ์ ANNONACEAE

ชื่ออื่น : พริกเหลือง



## ไม้พุ่มหรือไม้ต้น

สูง 13 ม. เปลือกสีน้ำตาลอมเทาถึงน้ำตาลเข้ม เรียบหรือหยาบเล็กน้อย มีช่องอากาศเล็กจำนวนมาก เปลือกในสีครีมถึงเหลืองหรือส้ม มีเส้นสีน้ำตาลสานกัน



ใบ รูปขอบขนาน กว้าง 3-5 ซม. ยาว 6-9 ซม. ปลายแหลมหรือเรียวแหลม โคนกลม ใบอ่อนสีเขียวอ่อน มีขนสีสนิมหรือสีอมขาวแน่น ใบแก่เนื้อคล้ายหนัง ด้านบนสีเขียวเข้ม ด้านล่างมีขนอย่างน้อยบนเส้นใบ เส้นใบ 8-10 คู่ห่างกัน ก้านใบยาวประมาณ 3 มม. มีขน กิ่งอ่อนมีขนหนาแน่นต่อไปเป็นสีน้ำตาลเข้ม เกือบ



ดอก ยาวประมาณ 0.6 ซม. สีชมพู ปลายมีสีเขียวเมื่ออ่อน เปลี่ยนเป็นสีเขียวอ่อนหรือสีครีมเมื่อแก่ ออกเดี่ยวหรือเป็นช่อมี 2-4 ดอก ก้านช่อดอกยาวถึง 7 ซม.

ก้านดอกยาวถึง 5 มม. ขนแน่นทั้งสองด้านออกที่ซอกใบหรือเหนือซอกใบเล็กน้อย าดอกกลม กลีบเลี้ยงรูปไข่ยาวประมาณ 2.5 มม. ปลายแหลม มีขนแน่นด้านนอก กลีบดอกวงนอกรูปไข่ ยาวประมาณ 4 มม. ปลายแหลม มีเส้น 5 เส้น เนื้อบางคล้าย

กระดาษ ด้านนอกมีขนแน่น ด้านในมีขนกระจายถึงค่อนข้างเกลี้ยง วงในยาว 7-10 มม. รูปเหลี่ยมเพชร ปลายทู่ โคนมีก้านเล็ก ยาวเท่ากับตัวกลีบแนบกันและเชื่อมกันตามขอบบน เมื่ออ่อนแยกกันเล็กน้อย แต่ไม่บานออก เมื่อแก่ ด้านในไปยังโคนมีต่อมน้ำหวานตามแนวราบ 2 ต่อมน เกสรเพศผู้สมบูรณ์ 6 อัน เรียง 1 วง ติดสลักกัน เกสรเพศผู้เป็นหมันที่คล้ายต่อม 3 หรือ 6 อัน เกสรเพศเมียมีขนแน่น 6 อัน รูปขอบขนาน มี 2-3 ออวูล

ผล ทรงกระบอก กว้าง 0.5-1 ซม. ยาว 3-5 ซม. ปลายแหลม ไม่มีก้านผล มี 4-6 ผล สีเขียวอ่อน สุกสีแดง ขนสีขาว มี 1(2) เมล็ด รูปขอบขนาน

พบทั่วไปในป่าดิบหรือป่ากึ่งผลัดใบ เขาหินปูน  
จ.ชุมพร ตรัง พัทลุง สตูล

อ้างอิงข้อมูล : ไชยมอน การ์ดเนอร์ พินดา สิทธิสุนทร และก้องกานดา ชยามฤต. ไม้ป่าภาคใต้เล่ม 2. ครั้งที่ 1 กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ ; 2559 (หน้า 138)

ภาพประกอบ : Npic-surat



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
National Parks Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)