

ไม้ต้นใหญ่ ไม้เ้าศัยไม้เ้าอื่น ผลัดใบช่วงสั้น สูงได้ถึง 30 เมตร เรือนยอดค่อนข้างแน่น ลำต้นเป็นลำต้นตรง มีพูพอนแผ่กว้างตามอายุ เปลือกสีเทาอ่อนถึงน้ำตาลออกชมพู เรียบหรือขรุขระเล็กน้อย เปลือกในสีส้มอ่อน มียางสีขาวจำนวนมาก ใบ กว้าง 4-12 เซนติเมตร ยาว 9-25 เซนติเมตร ออกสลับ (ใบบนๆ ออกกิ่งตรงข้าม) เรียงเวียน รูปไข่กว้างหรือแคบ หรือขอบขนานแกมรี ปลายทุ่หรือเรียวแหลม โคนทุ่หรือรูปหัวใจไม่เบี้ยว ขอบเรียบหรือจักซี่ฟันตื้นห่างๆ ใบแก่เนื้อคล้ายหนังบาง เกลี้ยงหรือมีขนอ่อนบนเส้นใบด้านบน มีขนอ่อนเล็กๆ บนเส้นใบด้านล่าง เส้นใบจากโคนยาว 1/4-2/3 ของใบ มักไม่เท่ากัน เป็นมุมแหลมชัน แตกแขนง ไม่ยาวไปถึงขอบ มีต่อมไขที่ซอกใบ เส้นใบข้าง 4-9(12) คู่ เป็นวง เส้นใบย่อยคล้ายชั้นบันไดหรือกิ่งร่างแห เห็นได้ด้านบน หนุนด้านล่าง ก้านใบยาว 3-12 เซนติเมตร เกลี้ยงหรือมีขนอ่อน มีสะเก็ด ทุ่ใบยาว 0.5-1.5 เซนติเมตร ร่วงเร็ว กิ่งต้นหรือพบน้อยกิ่งกลาง มีขนละเอียดเมื่ออ่อน ต่อไปเป็นสะเก็ด ผล ขนาด 2.5-3.5(5) เซนติเมตร มีก้านชัดยาว 2-6 เซนติเมตร ออกเป็นช่อแน่นบนปุ่มแข็งหรือบนลำต้นใหญ่ลำ ยาวได้ถึง 7 เซนติเมตร ทั้งหมดนี้พบตามลำต้นและกิ่งใหญ่ๆ ตั้งแต่ระดับพื้นดินถึงเรือนยอดต่ำๆ ผลทรงกลมถึงรีหรือรูปลูกแพร์ ปลายแบนหรือบวม มีช่องเปิดนูน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3-4 มิลลิเมตร ค่อนข้างเรียวไปยังโคน เป็นคอ ผลเล็กเรียวยาวได้ถึง 8 มิลลิเมตร มักมีสันและขีดจางๆ สุกสีชมพูหรือแดงนุ่น มีจุดสีขาวเล็ก หรืออาจจะยังมีสีเขียวสด แม้ว่าจะสุกเต็มที เกลี้ยงหรือมีขนอ่อนละเอียด พบทั่วไปในป่ารุ่นและป่าผลัดใบ-ป่าไผ่ หรือ ป่าดิบที่ถูกรทำลาย สูงได้ถึง 1,500 เมตร มักพบใกล้ลำธาร หรือใกล้ชายฝั่งแม่น้ำ



ข้อมูลอ้างอิง : การ์ตเนอร์, โชมอน ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม 3 (Mo-Z)-กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2561. 880 หน้า
ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์มอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

