

# พังกา

*Trema tomentosa* (Roxb.) H. Hara.

วงศ์ CANNABACEAE

ชื่ออื่น : ปอซีไก่

**ไม้พุ่ม** หรือไม้ต้นเล็ก สูงได้ถึง 12 ม. เรือนยอดแผ่กว้าง เปลือกสีเทา เกลี้ยง



**ใบ** ใบรูปไข่กว้างถึงรูปรีแกมไข่ กว้าง 4-6 ซม. ยาว 9-14 ซม. ปลายแหลมถึงเรียวแหลม ยาว .5-3 เท่าของความกว้าง โคนรูปหัวใจ และเบี้ยวซัด ขอบจักกลีกละเอียด ใบแห้งสีน้ำตาลเข้มทั้งสองด้าน ด้านบนหยาบซัด ด้านล่างสีน้ำตาลเงินและมีขนกำมะหยี่ แต่เห็นไม่ชัด ต้องการเว้นขยาย



**ดอก** คล้าย *T. orientalis* ยกเว้นดอกเพศผู้และดอกเพศเมีย อยู่บนช่อเดียวกันหรือต่างช่อ ใบประดับยาวประมาณ 1 มม. ช่อดอกเพศผู้ยาวถึง 5 ซม.



**ผล** รูปไข่หรือแบนเล็กน้อย ขนาดประมาณ 0.4 ซม. สีเขียวสุกสีดำแกมน้ำเงิน

พบทั่วไปในป่ารุ่นและตามชายป่า

อ้างอิงข้อมูล : ไชมอน การ์ดเนอร์ พินดา สิทธิสุนทร และก่องกานดา ชยามฤต. ไม้ป่าภาคใต้เล่ม 1. ครั้งที่ 1 กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ ; 2559 (หน้า 312)

ภาพประกอบ : Flickr by (Arthur Chapman , David Tng, hisusan2005, jt huang, techieoldfox, 潘立傑 LiChieh Pan)



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
National Parks Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)