

# สังเคียดร่างแห (ประยงค์ใบใหญ่)

*Aglaia oligophylla* Miq.  
วงศ์ MELIACEAE

**ไม้ต้น** เล็กถึงขนาดกลาง สูงได้ถึง 20 ม. มีพุ่มเล็ก เปลือก สีเทาอ่อนถึงสีน้ำตาลอมชมพู หรือสีน้ำตาลเข้ม เกือบหรือแตกเล็กน้อยเป็นแผ่น ไม่มียาวขาว



**ใบ :** ยาวได้ถึง 40 ซม. ใบประกอบแบบใบย่อย 3 ใบหรือแบบขนนกยอดเดี่ยว ใบย่อย 1-3(4) คู่ ออกตรงข้าม กว้าง 2-7 ซม. ยาว 5-20 ซม. รูปไข่กลับหรือรูปรี ปลายเรียวแหลมยาว โคนกลมหรือรูปลิ้นเบี้ยว ใบแก่เนื้อคล้ายหนังบาง เกือบด้านบน ด้านล่างมีขนรูปดาวสีน้ำตาลอมเหลืองอ่อน กระจายถึงแนบบนเส้นกลางใบ กระจายถึงเกลี้ยงบนผิวใบด้านล่าง แห้งสีเขียวอ่อน ค่อนข้างมันทั้งสองด้าน เส้นใบ 5-10 (6) คู่ โค้ง ค่อนข้างขนทั้งสองด้าน เส้นใบย่อยค่อนข้างขนด้านล่าง ก้านใบย่อยโคนบวม ก้านใบของใบด้านข้างยาวได้ถึง 1.2 ซม. ของใบปลาย ยาวได้ถึง 2 ซม. กิ่งเล็กเรียว มีขนรูปดาวสีน้ำตาลอมเหลืองอ่อน หรือเกล็ดไถลปลาย



ดอก : ยาว 2.5 มม. สีเหลืองอ่อน ออกเป็นช่อยาว 10-20 ซม. กลีบดอก 5 กลีบ รูปไข่กลับ  
หลอดอับเรณูยาว 1/2 ของกลีบดอก รูปกลมแบน (กว้างมากกว่าสูง) อับเรณู 5 อัน โผล่พ้นปากดอก  
เล็กน้อย



ผล : ยาวได้ถึง 3 ซม. กลม มีขนสีน้ำตาลอมเหลือง แก่ไม่แตก มี 1-2 เสี่ยง แต่ละเสี่ยงมี (0)1 เมล็ด  
หุ้มด้วยเนื้อใส รสหวานกินได้



นิเวศวิทยา : พบในป่าโปร่งป่าดิบที่ต่ำ  
และสันเขา



อ้างอิงข้อมูล : ไชมอน การ์ดเนอร์ พินดา สิทธิสุนทร และก่องานดา ชยามฤต. ไม้ป่าภาคใต้เล่ม 2. ครั้งที่ 1 กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คปฟ ; 2559 (หน้า 1239)

ภาพประกอบ : Npic-surat, www.wildlifeatrisk.org, Phytolimages.siu.edu