

ไม้พุ่ม หรือไม้ต้นเล็ก สูงได้ถึง 10(20) เมตร เปลือก สีน้ำตาลครีมถึงสีน้ำตาลเข้ม เกือบเกลี้ยง เปลือกในสีเหลืองอ่อนถึงส้มอมชมพู ใบ กว้าง 3-8 เซนติเมตร ยาว 10-22 เซนติเมตร รูปรีแกมขอบขนานถึงค่อนข้างรูปไข่หรือรูปไข่กลับ ปลายแหลมหรือเรียวแหลม โคนทู่หรือแหลม เกือบเกลี้ยงหรือมีขนบนเส้นใบ ไม่มีตุ่มใบ เส้นใบ 8-10 เส้น ไปจดกันที่ขอบใบ เส้นใบย่อยเป็นร่างแหละเอียด ก้านใบยาว 0.3-0.7 เซนติเมตร หูใบขนาน 2-7(13) มิลลิเมตร แคนดอกรูปเป็นช่อเล็กเรียวไม่แตกกิ่งหรือแตกกิ่งมาก ตามซอกใบ หรือออกเป็นกลุ่มใกล้ปลายกิ่ง กลีบเลี้ยง 3-5(6) กลีบ รูปถ้วยหรือสาม ยาวประมาณ 1 มิลลิเมตร แยกกันหรือเชื่อมติดกันที่โคนขึ้นมาครึ่งหนึ่งของกลีบ เกือบเกลี้ยงหรือมีขนกระจายทั้งสองด้าน ดอกเพศผู้ขนาด 1-2.5 เซนติเมตร ไม่มีก้านดอกหรือมีก้านดอก ยาวได้ถึง 1.5 มิลลิเมตร ช่อดอกยาว 3-13 เซนติเมตร มี 10(40) แขนง เกสรเพศผู้มี 3-4(6) อัน ยาว 1-2 มิลลิเมตร ฐานดอกคล้ายหมอน เกือบเกลี้ยงหรือเกือบเกลี้ยงล้อมรอบเกสรเพศผู้ รังไข่เป็นหมันค่อนข้างเกลี้ยง ดอกเพศเมียขนาด 4-10 เซนติเมตร มีได้ถึง 5 แขนง รังไข่เกลี้ยง เกสรเพศเมียติดที่ปลายยอด เกสรเพศเมียมี 3-4 อัน ผลขนาด 4-7 มิลลิเมตร ก้านผลยาว 1-4 มิลลิเมตร ออกเป็นยาวช่อออก 6-20 เซนติเมตร รูปกลม หรือรี หรือรูปไข่ ปลายบวม โคนไม่เบี้ยว อาจแบนเล็กน้อย เกือบเกลี้ยงหรือมีขนแห้งมีตุ่มเล็กๆ สีขาว พบในป่าดิบเดิม และป่ารุ่นสองฝั่งน้ำ ชายหาด ป่าพรุ *Antidesma* ชนิดนี้ พบมากที่สุดในภาคใต้



ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, โชมอน ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม 3 (Mo-Z)-กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2561. 880 หน้า

ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

