

ชื่อพื้นเมือง :

ไม้ตันขนาดเล็กถึงกลาง สูงได้ถึง 15 ม. เมื่ออ่อนมีลำต้นเดี่ยว (สูงได้ถึง 10 ม.) ต่อไปมีกิ่งใหญ่ตั้งชั้นหลายกิ่ง บางที่มีพุพอนรูปตัวแอล (L) เปลือกสีน้ำตาลอมครีมอ่อนถึงน้ำตาลอมเทาอ่อน ขรุขระด้วยมีช่องอากาศ เปลือกชั้นในสีส้มถึงสีน้ำตาลอมชมพู ค่อนข้างมีแอบสีแดงมียางขาวมากถึงจางๆ ใน ยาวได้ถึง 70 ซม. ในประกอบแบบขนนกยอดเดี่ยว ในบุ่ย 3-6(8) คู่ ออกกิ่งตรงข้าม กว้าง 1.5-8 ซม. ยาว 7-22 ซม. รูปใบถึงรูปไข่กลับ หรือรูปใบหอกแกมขอบนานปลายเรียวแหลม โคนกลมเป็นยอดรูปหัวใจหรือรูปคลิน ในแก่ด้านบนสีเขียวเข้ม มีเกล็ดรูปดาวเล็กๆ ไม่น่าจะรูปเล็กๆ ด้านล่างสีน้ำตาลเงิน มีเกล็ดรูปดาวเล็กๆ สีน้ำตาลอมส้มหรือเกล็ดรูปโล่ ขอบไม่เรียบบนเส้นใบและผิวใบด้านล่าง ปนกับขนรูปดาวแน่นสีน้ำตาล แห้งสีเขียวอมเทาด้านล่าง เส้นใบ 7-14 คู่ ใบข้างมีก้านใบยาวได้ถึง 1.2 ซม. ในปลายยาวได้ถึง 1.8(3.5) ซม. กิ่งเล็กเรียว มีเกล็ดรูปดาวสีน้ำตาลอมส้มหรือสีอกรองแน่นเมื่ออ่อน ดอก ยาวประมาณ 1.5 มม. สีครีมถึงสีเหลือง กลมแบบ (กว้างมากกว่าสูง) ช่อดอกเพศผู้ยาวได้ถึง 40 ซม. ช่อดอกเพศเมียยาวได้ถึง 30 ซม. ก้านดอกยาว 1-2 มม. กลีบเลี้ยงยาว 1/3-1/2 ของกลีบดอกปลายจักกลีกเกือบถึงโคนเป็นพุกกลม 5 พุ ด้านนอกมีเกล็ดแน่น กลีบดอก 5 กลีบ รูปรีหรือกลม หลอดเกสรเพศผู้สั้นกว่ากลีบดอก รูปถ้วยตื้นหรือรูปไข่ อับเรณู 5 อันติดต่อกันปากหลอดโผล่พ้นปากหลอด และซึ่งไปที่กล่องดอก ผล กว้างได้ถึง 1.5-2.4 ซม. ยาวได้ถึง 2-3 ซม. (อาจ กว้างได้ถึง 4 ซม. ยาวได้ถึง 5 ซม.) ออกเป็นช่อยาวได้ถึง 20 ซม. ผลรูปไข่กลับกว้างหรือค่อนข้างกลม มีขัน หรือเกล็ดละเอียดสีน้ำตาลอมส้มแน่น แก่ไม่แตก มี 2 ส่วน แต่ละส่วนมี (0)1 แมล็ด มีเนื้อใสหรือสีขาวทั้ม พนในปาดินที่ต่ำที่สุดทำลายบังหรือปาดิน-ปาไฝ่ สูงประมาณ 300 ม. บางทีบนหินปูน จ.พังงา สุราษฎร์ธานี พังงา

ข้อมูลอ้างอิง : ไรมอน การ์เดนเซอร์ ศิริกา ลิทธิสุนทร กองการคาด ขยายอุด ไม้ป่าภาคใต้ – พิมพ์ครั้งที่ 1-กรุงเทพฯ โครงการจัดพิมพ์ปีที่ 2559. หน้า 792

