

# ตาเสือใบเล็ก

*Aglaia spectabilis* (Miq.) S. S.Jain & Bennet

วงศ์ MELIACEAE

ชื่ออื่น : สั้งไม้



**ไม้ต้น** ขนาดกลางถึงใหญ่ สูง 12-26 ม. เรือนยอดเปิด มีกิ่งตั้ง 2-3 กิ่ง ปลายมีใบแน่นเป็นกระจุก โคนเป็นพู่พอน คล้ายแผ่นกระดาน สูงได้ถึง 2 ม. เมื่อมีอายุแก่ขึ้น เปลือกสีน้ำตาลอ่อนถึงสีชาอมเทา หรือสีเทาอมสีม่วงเข้ม ชั้นในสีชมพูถึงสีน้ำตาลอมแดง มียางขาว



**ใบ** : ใบยาว 50-80(120) ซม. ใบประกอบแบบขนนกยอดเดี่ยว ใบย่อย 5(7)-10 คู่ กว้าง 2.5-6 ซม. ยาว 8-25 ซม. พบข้างที่ใหญ่กว่านี้ รูปขอบขนานแกมรีถึงรูปใบหอก ปลายเรียวแหลม โคนเบี้ยว ใบแก่เนื้อคล้ายหนัง ด้านบนสีเขียวเข้ม เกือบดำด้านล่าง มีขนรูปดาวสีน้ำตาลแน่นบนเส้นกลางใบและกระจายบนผิวใบ มีรูเล็กๆ ทั้งสองด้านเส้นใบ 9-19 คู่ โคนชันใกล้ขอบ เป็นร่องด้านบน หนูนด้านล่าง ก้านใบย่อยยาว 0.8-2 ซม. ก้านช่อใบยาว 14-25 ซม. ด้านบนแบน กิ่งใหญ่ล้า ขอบเป็นคลื่น เมื่ออ่อนมีขน/เกล็ดแน่น (อาจพบเฉพาะที่ตาดอก)



**ดอก :** ยาว 2-5 มม. (ดอกเพศผู้) หรือยาวได้ถึง 7 มม. (ดอกเพศเมีย) สีขาวหรือเหลือง รูปรี กลิ่นหอม ช่อดอกยาวได้ถึง 50 ซม. มีแกนกลางใหญ่ล่ำ ก้านดอกยาวได้ถึง 3 มม. กลีบเลี้ยงยาว 1/2-2/3 ของกลีบดอก รูปถ้วย ปลายจักลึกครึ่งกลีบเป็นแฉกทู่ 3 แฉก มักมีขนแน่น กลีบดอก 3 กลีบ กว้างได้ถึง 2.5 มม. ยาวได้ถึง 4 มม. รูปรี คล้ายหมวก ปลายบางคล้ายกระดาษ มีเกล็ดรูปดาวจำนวนมาก หลอดเกสรเพศผู้ สั้นกว่ากลีบเลี้ยงดอกเล็กน้อย รูปถ้วยอัชเรณู 6 อัน โพล์พื้นหลอดเล็กน้อย



**ผล :** กว้าง 4.5-8 ซม. ยาว 6-9 ซม. ออกเป็นช่อใหญ่ ล่ำยาวได้ถึง 13 ซม. ผลกลมหรือรูปไข่กลับกว้าง เปลือกนอกหนาได้ถึง 1 ซม. หนาเหนียว มียางขาว มีขนรูปดาวสีน้ำตาลอมเหลืองอ่อนหรือสีน้ำตาลแดงแน่นเมื่ออ่อน สีชมพูใสถึงสีแดงแก่แตกมี 3(4) ส่วน แต่ละส่วนมี (0)1 เมล็ด มีเนื้อสีเหลืองหรือสีแดงหุ้มเมล็ด

**นิเวศวิทยา :** พบในป่าดิบ สูงได้ถึง 400 ม. ต้นอ่อนมักขึ้นตามช่องว่างในป่า และตามชายป่า จ. พังงา สตูล

**อ้างอิงข้อมูล :** ไชมอน การ์ดเนอร์ พินดา สิทธิสุนทร และก่องกานดา ชยามฤต. ไม้ป่าภาคใต้เล่ม 2. ครั้งที่ 1 กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ ; 2559 (หน้า 1244)

**ภาพประกอบ :** Flickr by (loupok , SierraSunrise , Wee Foong Ang ) , <http://commons.hortipedia.com> , <http://ssg.carousel.com> , <http://tropical.theferns.info> , Medthai