

Syzygium ixoroides Chantar. & J.Parn.

วงศ์ MYRTACEAE

หว้าใบเข้ม

ชื่อพื้นเมือง :

ไม้ต้น ไม่ผลัดใบ เมื่อแก่มีพุพอนพบ น้อยมีรากค้ำยัน เปเลือก เรียบถึงแตก มักเป็นเกร็ดบางคล้ายกระดาษ ดอกทุกดอกมีกลีบเลี้ยง 4 กลีบ กลีบดอก 4 กลีบ กลีบเลี้ยงไม่เหมือนข้อบนเส้นกลางใบส่วนมาก เป็นร่องด้านบน ในส่วนมากยาวประมาณ 15 ซม. เกลี้ยงทั้งสองด้าน ถ่ายฐานดอกเรียบ ถึงมีสันหรือตุ่ม ก้านดอกไม่มีหรือก้านสันยาวประมาณ 4 มม. ก้านเกรสรเพมียาวประมาณ 8 มม. ถ่ายฐานดอกยาว 2.5-7 มม. กลีบเลี้ยงยาวประมาณ 2 มม. กลีบดอกยาว 2.4.5 มม. เส้นขوبใบ 2 เส้น เส้นใบ 8-21 คู่ ไม่มีก้านดอก ปลายใบไม่มีต่อม ใบยาว 7-15 ซม. ปลายแหลมหรือเรียวแหลม ช่อดอกและถ่ายฐานดอกไม่มีตุ่ม ถ่ายฐานดอกสูง 3.5-6 มม. ก้านยาว 1.5-2.5 มม. ($\frac{1}{3}$ - $\frac{1}{2}$ ของถ่ายฐานดอก) กิ่งสีน้ำตาลแดง ปลายเรียวแหลม 8-14 คู่ ช่อดอกออกที่ปลายกิ่งเท่านั้น



ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์ ไรมอน นิป้ากาศได้ เล่ม 3 (Mo-Z)-กรุงเทพฯ : อิมแพ็คพิพิธภัณฑ์สือชิริ จำกัด (มหาชน), 2561. 880 หน้า
ภาษาไทย : ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

