

หวายกำพวน

Calamus longisetus Griff.

วงศ์ ARECACEAE



ชื่ออื่น : รอตตบู่โบ (มลายูท้องถิ่น-ยะลา)

หวาย ขนาดใหญ่ขึ้นเป็นกอ ลำต้น เลื้อยป็นปาย ยาว 10-20 ม. มีกาบใบกาบหุ้มลำ เมื่อสดมีสีเหลือง ออกเขียว เมื่อแห้งมีสีน้ำตาล มีหนามรูปสามเหลี่ยมแบน สีน้ำตาลแดงหรือดำ โคนสีเหลืองหรือสีน้ำตาลนูนขึ้น เล็กน้อย หนามมีหลายขนาดขึ้นอย่างหนาแน่น หนามรูป แลบสั้นๆ พบเป็นกระจุก หรือเดี่ยวๆ และมีหนามรูปเข็ม แทรกอยู่อย่างหนาแน่น หนามส่วนใหญ่เฉียงลง ปากกาบ หุ้มลำมีหนามรูปสามเหลี่ยมกระจายอยู่ห่างๆ

ใบ : ใบประกอบแบบขนนก เรียงแบบตรงข้าม แผ่นใบหนา ใบย่อยรูปขอบขนาน มีหนามอยู่ทั่วใบ ผิวใบมีหนามสั้นปกคลุม ด้านบนมีหนามรูปขนบนเส้นใบ ด้านล่างมีหนามรูปขนบนเส้นใบช่วงปลาย ขอบใบมีหนามรูปขนแข็ง ปลายใบแหลม ใบย่อยแต่ละข้างของทางใบเรียงตัวเป็นกลุ่มๆ แบบเยื้องกัน หรือตรงข้ามตรงข้าม ใบกว้าง 2-3 ซม. ยาว 150-200 ซม. เส้นใบแตกแบบขนานตามยาว เส้นกลาง ใบมีหนาม



ดอก : ออกเป็นช่อ ช่อดอกยาว 10-15 ซม.
ออกบริเวณซอกกาบใบ



ผล : ผลเดี่ยว ออกเป็นช่อรูปไข่ ปลายผลแหลมยื่นออกเล็กน้อย ผลอ่อนสีดำปนน้ำตาล ผลแก่สีน้ำตาลปนเหลือง ปลายเมล็ดหุ้มผลมีสีดำสลับกับสีน้ำตาลเป็นแถบ ขอบเมล็ดมีขนสั้นๆ สีน้ำตาลอ่อนหรือเป็นริ้วๆ



นิเวศวิทยา : ป่าดิบชื้น ทั่วไปในคาบสมุทรมซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในหุบเขาจนถึงระดับความสูง 600 เมตร
การกระจายพันธุ์ : โกลบอล - บังกลาเทศพม่า (มาเลเซีย) คาบสมุทรมมาเลเซีย
ประเทศไทย - ภาคเหนือ(กำแพงเพชร) , ภาคใต้ (เพชรบุรี , ชุมพร, สุราษฎร์ธานี, กระบี่, ตรัง, สตูล, สงขลา)

อ้างอิงข้อมูล : <http://srdi.yru.ac.th/bcqy/page/759/%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%A7%E0%B8%99.html>
<http://thaipalm.myspecies.info/taxonomy/term/888/descriptions>

ภาพประกอบ : <https://rdi.yru.ac.th> , <http://sweetgum.nybg.org> , www.palmpedia.net