

หญ้าหนุตัน

Dianella ensifolia (L.) DC.

วงศ์ XANTHORRHOACEAE

ชื่ออื่น : ไก่กำแล่น ศรีคันไชย ลำพัน หญ้าหนู ชีบะ เซียอ๊ะ



ไม้ล้มลุก มีความสูงจากพื้นดินประมาณ 30-60 ซม. นอกจากส่วนที่อยู่โผล่พ้นดินแล้ว หญ้าหนุตันยังมีส่วนที่เป็นเหง้าใต้ดินที่ขึ้นในลักษณะเป็นกอขนาดเล็กด้วย

ใบ : เป็นใบเดี่ยว เรียงสลับ แตกเป็นกระจุกที่โคนต้น อยู่ในระนาบเดียวกัน และห่อเรียงสลับกันขึ้นมาจาก โคนต้นลักษณะใบเป็นรูปขอบขนานหรือรูปหอก ขนาดกว้างประมาณ 1-4 ซม. ยาวประมาณ 20-60 ซม. ฐานใบมน ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ ก้านใบแผ่เป็นแผ่น และหุ้มซ้อนกัน



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Parks Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

ดอก : ออกเป็นช่อ โดยออกดอกบริเวณซอกใบที่โคนต้นหรือออกที่ปลายกิ่ง มีใบประดับขนาดใหญ่รองรับกลีบเลี้ยงและกลีบดอกมีสีขาวแกมม่วงและมีลักษณะที่เหมือนกัน โดยมีลักษณะเป็นหลอดเล็กๆ ปลายแยกเป็นกลีบ 6 กลีบ ภายในดอกมีเกสรเพศผู้สีเหลือง 6 อัน



ผล : มีลักษณะเป็นทรงกลม ผลอ่อนมีสีเขียว เมื่อสุกจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงอมน้ำเงินหรือสีม่วงเข้ม ผลมี 3 พู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 0.8 ซม. ภายในผลมีเมล็ดเล็กๆ ลักษณะเมล็ดเป็นทรงรีและปลายค่อนข้างแหลม



นิเวศวิทยา : พบในอินเดีย เนปาลจีนตอนใต้ ถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และออสเตรเลีย ในประเทศไทยพบตามป่าดงดิบและที่ชื้น ที่ระดับความสูง 500-1,200 ม.

อ้างอิงข้อมูล : <https://www.samunpri.com/%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99/>

ภาพประกอบ : www.phargarden.com , www.samunpri.com